

Bulletin arbo bio n°2

20.02.2026

En raison des quantités importantes de précipitations, il est difficile de pratiquer et travailler avec des machines dans les vergers. Or la hausse des températures annoncée dès cette fin de semaine va entraîner une reprise d'activité des psylles et favoriser le développement des bourgeons des fruitiers à noyau. **Préserver vos sols et ne rentrer dans vos parcelles qu'une fois qu'elles seront à nouveau praticables !**



Les pêcheurs sont sensibles à la cloque dès le stade pointe verte, Photo : FiBL, Flore Araldi

Répulsion contre le psylle du poirier

La douceur de ces prochains jours sera idéale pour le vol et la ponte de psylle du poirier. Au-delà de 9°C, les psylles du poirier reprennent leur activité. En effet si durant deux jours consécutifs la température excède cette limite, les femelles matures fécondées commencent à pondre.

Afin de protéger les poiriers, appliquer du kaolin à raison de 32 kg/ha ou du carbonate de calcium à 64 kg/ha. Deux passages en sens inverse à demi-dose sont conseillés lors du premier passage de façon à optimiser la couverture du produit. Puis renouveler les applications lorsque la couverture est lessivée en respectant les 4 applications maximum par année avant le début de la floraison.

Le kaolin va créer une barrière physique à laquelle les psylles vont se confronter. Ils seront alors gênés dans leur mouvance et leur ponte et se détourneront de l'arbre.

Lutte préventive contre la cloque du pêcher

L'ouverture des bourgeons devraient arriver tout prochainement et le stade de sensibilité « pointe verte » atteint. Dès lors et avant la prochaine pluie ou la prochaine période de forte humidité, protéger les arbres de manière préventive avec du cuivre à raison de 400 à 500 g de cuivre métal/ha et de renouveler l'application dès lessivage.

Lutte préventive contre la bactériose et la maladie criblée des fruitiers à noyau

Dès le débourrement et jusqu'à l'ouverture des sépales, les traitements cupriques peuvent diminuer l'inoculum des bactéries. Ces traitements sont particulièrement recommandés sur pêchers, abricotiers, pruniers et cerisiers. Le cuivre est également efficace contre la cloque (voir plus haut) et la maladie criblée. Intervenir avec 400 à 700 g/ha de cuivre métal, sans oublier que le cuivre est limité à **4 kg/ha/an** pour les fruits à noyau selon le cahier des charges Bio fédéral et de **3 kg/ha/an** selon Bio Suisse et Demeter.

Liens

[Liste des intrants 2026 \(FiBL\)](#)

Pour recevoir le bulletin gratuitement par e-mail, inscrivez-vous auprès de Flore Araldi (flore.araldi@fibl.org).