

Bulletin arbo bio n°5

17.03.2026

Malgré une baisse des températures, la phénologie des arbres fruitiers continue à avancer. La période des infections primaires de tavelure est lancée. Par ailleurs, la floraison des pruniers ne devrait plus trop tarder, pensez à installer les pièges à hoplocampe dans les parcelles sensibles.



Les poiriers sont généralement entre les stades « oreille de souris » et « bouton vert », Photo : FiBL, Flore Araldi

Tavelure sur fruits à pépins

Les risques sont faibles pour le moment, mais surveiller bien les futures périodes humides qui pourraient générer des risques d'infection plus ou moins importants : consulter RIMpro ou Agrométéo, afin de positionner au mieux les interventions. A ce jour, un risque est annoncé pour la fin de semaine, il se précisera d'ici-là.

Favoriser une couverture préventive des fruitiers à pépins, avec maximum 400 g de cuivre métal. En "stop", dans une période de 300 degrés-heures après infection, Curatio 25 l/ha maximum sur feuillage humide ou le mélange bicarbonate de potassium (Armicarb, GHEKKO, Carbofort 4.8 kg/ha ou Vitisan 5 kg/ha) + soufre 3 à 6 kg/ha.

Oïdium du pommier

D'après le modèle de prévision des risques RIMpro de l'oïdium du pommier, la sporulation sur les lésions de l'année passée (infection primaire) démarre ces jours dans la majorité des régions romandes. Coupler la prévention avec celle de la tavelure à l'aide

de soufre de 3 à 6 kg/ha. Afin d'optimiser sa sublimation et son efficacité, appliquer le soufre dans des conditions lumineuses et une température supérieure à 12°C.

Prévention contre *Monilinia laxa*

Continuer de prévenir les risques de contamination des fleurs jusqu'à la chute des pétales. Utiliser le mélange Bicarbonate de potassium 4.8 à 5 kg/ha + soufre 4.8 kg/ha + cuivre métal 250 à 400 g/ha (aussi possible sans cuivre).

Hoplocampes

La floraison approche, notamment pour les pruniers, pensez à mettre en place les pièges blancs sur les parcelles où des dégâts d'hoplocampe ont été observés l'année passée. Les pièges blancs collants doivent être installés (2-3 pièges par variété) au début de la floraison à hauteur du regard dans les vergers de pommiers, poiriers et pruniers. Des observations sont à réaliser une à deux fois par semaine et permettront d'estimer les populations. Le seuil de tolérance dépend de la variété et de l'importance de la floraison : 20-30 guêpes par piège sur des variétés sensibles ou si la floraison est faible ; autrement 30-40 guêpes par piège sur d'autres variétés ou si la floraison est abondante. Il est conseillé de les retirer à la chute des pétales pour éviter d'attirer et de piéger les auxiliaires et les pollinisateurs.

Rappel ravageurs des fruitiers

Les populations de plusieurs insectes nuisibles se développent beaucoup plus faiblement et moins rapidement après un traitement au débourement à l'huile minérale ou végétale. Préférer l'huile végétale, non irritante et qui se dégrade plus rapidement. Cette application doit être réalisée par temps chaud (semaine prochaine semble propice), afin de toucher les œufs hivernants lorsqu'ils reprennent de l'activité. L'efficacité est également augmentée avec la quantité d'huile appliquée, mais attention celle-ci diminue avec l'avancement du stade phénologique des arbres, de façon à ne pas nuire à la végétation (risque de brûlures). On conseille : 3.5% (56 l/ha) aux stades BBCH 51-53 (B-C) de manière à toucher l'acarien rouge, la cochenille diaspine (Pou de San José inclus), la cochenille lécanine, la cheimatobie, les phytoptes et le phytopte du prunier ; puis 2% (32 l/ha) aux stades BBCH 54-56 (D) contre l'acarien rouge ; et enfin 1% (16 l/ha) aux stades BBCH 57-58 (D3-E) contre l'acarien rouge. Veiller à bien répartir la bouillie sur l'arbre entier en travaillant avec un haut volume d'eau (min. 1'000 l/ha), des buses fines ou en aller-retour. De cette façon, la bouillie atteindra mieux les aspérités du bois. Ne pas intervenir si risque de gelées nocturnes. Un délai de 5 à 8 jours doit être respecté avant toute autre intervention, hormis le cuivre à maximum 0.1% qui peut être mélangé avec les huiles.

Liens

[Liste des intrants 2026 \(FiBL\)](#)

[Prévisions de risque de tavelure du pommier avec RIMpro \(bioactualités.ch\)](#)

[Prévisions du risque de tavelure du poirier avec RIMpro \(bioactualités.ch\)](#)

[Tavelure du pommier \(Agrométéo\)](#)

[Oïdium du pommier \(bioactualités.ch\)](#)

Pour recevoir le bulletin gratuitement par e-mail, inscrivez-vous auprès de Flore Araldi (flore.araldi@fibl.org).