

Bulletin arbo bio n°13

19.06.2026

Alors que les récoltes des fruits d'été avancent bien, la semaine à venir s'annonce caniculaire. Limiter au maximum les interventions phytosanitaires qui perdent en efficacité à partir de 25°C et toute source de stress supplémentaire pour les végétaux.



La récolte des fruits d'été comme l'abricot sont en cours, Photo: FiBL, Flore Araldi

Maladies des fruitiers à pépins

Les risques d'infection secondaire de tavelure sont actuellement peu importants, contrôler bien les prévisions et renouveler la protection en fonction de la présence de tâches sur feuilles ou sur fruits dans vos vergers avant de potentiels orages.

En préventif, utiliser soit Myco-sin 8 kg + soufre 2 à 3 kg, soit bicarbonate de potassium 3 à 5 kg + soufre 2 à 3 kg. En stop, préférer Curatio 15 L/ha en conditions humides. Noter que Armicarb est efficace contre la maladie de la suie, Myco-sin contre les maladies de conservation et *Marssonina*.

Avec les chaleurs annoncées et la fin de la croissance des pousses, la pression oïdium diminue. Au besoin, ôter et exporter les organes atteints.

Tordeuses

Les conditions sont propices aux éclosions et au développement des larves. Renouveler les interventions au virus (Carpovirusine, Madex Top ou Carpovirusine Evo2, Madex Twin selon la pression des parcelles) tous les 8-10 jours comme ces produits sont sensibles aux UV et à la chaleur. Les granulovirus sont miscibles dans une bouillie au pH compris entre 5 et 8,5 : l'association avec des produits à pH acide (préparations à base d'argile) ou alcalin (savons, polysulfure de calcium) n'est pas recommandée.

Drosophila suzukii et mouche de la cerise

Contrôler la présence avec des pièges aux abords de la parcelle. Surveiller les courbes de SOPRA pour la mouche de la cerise et d'Agrométéo pour *Drosophila suzukii* et appliquer au maximum les mesures d'hygiène pour limiter la propagation. Spécifiquement contre la mouche de cerise et avec un délai avant récolte de 2 semaines, il est possible d'utiliser l'azadirachtine à 4 L/ha pour limiter les pontes et réduire l'attractivité des fruits.

En dernier recours, intervenir avec du Spinosad - qui a une action uniquement sur les formes adultes - en respectant un délai de 7 jours entre les applications et avant récolte (2 applications maximales).

Liens

[Liste des intrants 2026 \(FiBL\)](#)

[Prévisions du risque de tavelure du pommier avec RIMpro \(bioactualités.ch\)](#)

[Tavelure du pommier \(Agrométéo\)](#)

[Oïdium du pommier \(bioactualités.ch\)](#)

[Avertissement des ravageurs en arboriculture \(SOPRA\)](#)

[Drosophila suzukii en Suisse romande \(Agrométéo\)](#)

Pour recevoir le bulletin gratuitement par e-mail, inscrivez-vous auprès de Flore Araldi (flore.araldi@fibl.org).